

Spritzinstruktion Gonasi 5000 IE

Injizieren einer Ampulle Gonasi

Schritt 1 Material bereit legen

- Flakon mit Gonasi-Pulver;
- Vorgefüllte Spritze mit Lösungsmittel;
- Lange Nadel speziell für die Zubereitung;
- Kurze Nadel für die subkutane Injektion
- Entsorgungsbox;

Schritt 2 Hände waschen

Schritt 3 Spritze vorbereiten



- Entfernen Sie die Kappe von der vorgefüllten Spritze.
 - Stecken Sie die Präparationsnadel (lange Nadel) mit der noch aufgesetzten Schutzkappe auf die Spritze. Überprüfen Sie, ob die Nadel fest sitzt, damit die Lösung nicht aus der Spritze austritt. Bei Undichtigkeiten versuchen Sie, die Nadel durch leichtes Drehen besser festzuziehen.
 - Setzen Sie die Spritze vorsichtig ab.
 - Berühren Sie niemals die Nadel.
- Entfernen Sie die farbige Kappe von dem Pulverfläschchen, indem Sie sie vorsichtig nach oben drücken.



Nehmen Sie die Spritze, entfernen Sie die Schutzkappe von der Nadel und stechen Sie die Nadel durch die Mitte des Gummistopfens des Pulverfläschchens.




- Drücken Sie den Kolben fest nach unten und spritzen Sie langsam das gesamte Lösungsmittel in das Pulverfläschchen.
- NICHT SCHÜTTELN. Rollen Sie das Fläschchen vorsichtig zwischen Ihren Händen hin und her, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Achten Sie darauf, dass sich kein Schaum bildet.

Sobald sich das Pulver aufgelöst hat (was in der Regel sofort geschieht), ziehen Sie die Lösung langsam in die Spritze.


Überprüfen Sie, ob die vorbereitete Lösung klar und farblos ist.

Hinweis: Wenn Sie 2 Fläschchen Gonasi auflösen müssen, spritzen Sie das bereits aufgelöste Arzneimittel in das zweite Fläschchen Gonasi. Auch dieser wird sich sofort auflösen. Anschließend saugen Sie das aufgelöste Medikament ab.

Wenn die Spritze die richtige Dosis für Sie enthält, setzen Sie die Schutzkappe auf die Nadel. Entfernen Sie die lange Nadel aus der Spritze. Stecken Sie die kurze Nadel für die subkutane Injektion auf die Spritze, während die Schutzkappe noch aufgesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Nadel fest sitzt, und drücken Sie die kurze Nadel fest auf den Spritzenzylinder. Drehen Sie sie dann leicht, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingeschraubt ist, damit eine feste Dichtung entsteht und keine Lösung ausläuft.



- Ziehen Sie die Schutzkappe von der Nadel ab. Halten Sie die Spritze mit der Nadel nach oben und klopfen Sie leicht auf die Seite der Spritze, um Luftblasen nach oben zu befördern.



- Drücken Sie den Kolben ein, bis ein Tropfen Flüssigkeit an der Spitze der Nadel erscheint.
 - Spritzen Sie das Medikament nicht, wenn es Partikel enthält oder trüb ist.
- Stecken Sie die Aspirationsnadel in die Entsorgungsbox.

Schritt 4 Das injizieren.

- Nehmen Sie eine Falte Ihrer Bauchhaut zwischen Ihren Fingern. Nehmen Sie die Spritze und injizieren Sie senkrecht in die Falte.
Hinweis: Injizieren Sie das Medikament langsam.
- Wenn alles gespritzt wurde, entfernen Sie die Spritze und stecken Sie die Nadel in die Entsorgungsbox.
- Alle Abfälle können im Hausmüll entsorgt werden, mit Ausnahme der angebrochenen Ampullen und Nadeln. Diese gehören in die Entsorgungsbox. Sie können diese (wenn sie voll sind oder nicht mehr benötigt werden) bei uns in der Apotheke oder bei der Gemeinde (chemische Abfälle) abgeben.

Injektion einer halben Ampulle Gonasi

Wenn Sie eine halbe Durchstechflasche Gonasi injizieren müssen, dann lösen Sie gemäß der obigen Anleitung zuerst eine Durchstechflasche auf und spritzen dann aus dieser Durchstechflasche (d.h. vor der Injektion) die Hälfte der Flüssigkeit aus der Spritze. Dann injizieren Sie das restliche Medikament.

Viel Glück!